

# Substituição de gerador de Pacemaker / Cardioversor-Desfibrilhador



Serviço de Cardiologia

Localização: Piso 4



## Substituição de gerador de Pacemaker / Cardioversor-Desfibrilhador

INFORMAÇÃO PARA O UTENTE E FAMÍLIA  
Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE



**Objetivo:** Substituição do gerador (bateria) do dispositivo previamente implantado.

**Modo de realização:** O procedimento inclui a obtenção de acesso venoso periférico para administração intravenosa profilática de antibióticos e para eventual sedação e analgesia com medicamentos por via endovenosa. Durante o procedimento é realizada monitorização eletrocardiográfica, da pressão arterial e da oximetria digital (avaliação do nível de saturação em oxigênio).

O procedimento é efetuado sob anestesia local. É efetuada uma pequena incisão, na zona onde se encontra o gerador; este é retirado, os eletrocateres são conectados ao novo gerador e este é colocado na local subcutânea, sendo a incisão cutânea encerrada com linha de sutura. Após o procedimento deve ser efetuado período de repouso, variável com as condições clínicas.

**Efeitos esperados e eventuais benefícios:** Manutenção do normal funcionamento do dispositivo, garantindo o tratamento já instituído.

**Alternativas terapêuticas:** Não aplicável .

**Riscos/complicações:** O procedimento é geralmente seguro, sendo muito raras as complicações. As complicações mais frequentes (1-3%) incluem: hemorragia/hematoma no local da implantação, sobretudo se estiver a tomar anticoagulantes (apixabano, dabigatran, edoxabano, rivaroxabano, varfarina) ou antiagregantes plaquetários (aspirina, clopidogrel, ticagrelor); danificação dos eletrocateres; infeção da local do pacemaker (habitualmente com necessidade de antibióticos e/ou remoção do dispositivo).

Podem ocorrer reações adversas, por exemplo, alergias e ou depressão respiratória, aos medicamentos administrados.

**Informe o seu médico** caso tenha alguma doença, alergias ou tome medicamentos que provoquem alteração na coagulação do sangue, pois estas situações aumentam o risco de complicações.

**Outras informações:** A existência de outras patologias associadas/comorbilidades, ou características específicas do doente, poderão estar associadas a risco acrescido de complicações.