

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR À NOTA DE ALTA
CATERISMO CARDÍACO VIA ARTÉRIA RADIAL

- ♥ Após o exame que realizou, o/a enfermeiro/a colocou-lhe uma pulseira no pulso (dispositivo de compressão) para que não haja perda de sangue pelo local de punção.
- ♥ Foi-lhe retirada a pulseira antes de ter alta para o domicílio. Relativamente ao braço pelo qual foi realizado o cateterismo deve: evitar fazer esforços, sobretudo no dia do exame e cumprir o possível repouso do membro até 2-3 dias após o exame. Pode retirar o penso de proteção 2 dias após o exame e deixar exposto ao ar.
- ♥ Se sangrar abundantemente do local de punção, deve fazer compressão localizada, elevar o braço e dirigir-se ao Hospital, explicando o exame a que foi submetido/a.
- ♥ Em caso de equimose – nódoa negra, pode aplicar suavemente pomada venotrópica (p.ex Thrombocid ou Hirudoid pomada), 2 a 3 vezes por dia e aplicar gelo no local.
- ♥ Vigie o local de punção relativamente à presença de sinais inflamatórios: *calor, tumefacção e dor.*
- ♥ Raramente podem surgir sinais de compromisso neurocirculatório do membro envolvido- *dormência dos dedos, alteração de temperatura e/ou da coloração abaixo do local da punção.*

Caso surja alguma destas alterações ou caso tenha alguma questão, contacte por favor o Serviço de Cardiologia

969342914 nos dias úteis das 8 às 20 horas
214348412 nos restantes horários.

