

Kuse ke é um colposcopia?

- É um observasan ke ta fazedo na colo de útero, vagina/corpo de mudjer, vulva ta fazedo ku un aparelho ke tchomado colposcópio, kel aparelho li ta aumenta imagem nu katal odja sem ajuda e assim ta permite medico fazi diagnóstico mas dreto e discubri kusa ki bu tem.
- Kel exame li é recomendado pa mudjeres ki tene un resultado alterado na exame anterior, i pode ser na exame de citologia Papaniculau ou suspeita positiva de HPV (Papiloma Vírus Humano), ou na ke durante um exame ginecológico reparado algum alterason.
- N”quanto medico ta fazê exame pu pode atcha tudo k esta fazi através de monitor/television k esta bu frenti.

Nadi ki ta fazedo?

- Bu ta deta na um marquesa/cama bu ta fika ku perna aberta cada um pa sê lado, é ta po um instrumento/boca de pato na entrada de vagina/corpo de mudjer pa es podi achta la dentro de vagina pa é podi observa colo de útero, vagina e vulva ku kel instrumento ke ta aumenta imagem.
- Aparelho ta fica dento vagina mas kata toca na nenhum orgon dentro de bo.
- Durante exame medico ta pou um likido ki tem um cor riba bu colo e bu vagina pa é pôdi djobi área ke tem algum anomalia/ka sta dreto.
- N”quanto medico ta fazê exame é ta faze uma colheita de vestígio pa realiza exames, tipo citologia, colheita de HPV ou biópsia (biópsia é um bocado de nos corpo ki ta trado pa fazedo exame mas profundo).
- Kel tipo de exame pode da cólicas/dor ou mau star na barriga.

Si bu fazi um biopsia, bu devi evita esforço, pa bia buta mo e ta hemorragia/perde sangue que pode dura 3 a 5 dia, bu debe de evita:

- Fazi sexu;
- Pi tampon;
- Fazi lavagem vaginal ki likide vaginal;
- Bu devi toma banho só de xuvero.

KEL EXAME LI KATA DUE.



Na dia de exame

- ▣ Ora ki bu tchiga hospital, butem ki tira 1 senha “A” pa bu pôdi confirma bu presença/xegada ou na caso de bu ten carton de cidadon bu pôde confirma bu presença/xegada na makinas ke têm na consulta externa.
- ▣ Dipôs bu debi espera pa xamada na sala de spera de ginecologia.
- ▣ Dipôs ki medico txama pa bu nome oras ki bu entra no gabiente, bu tem ki dispi roupa de cintura pa baxo.
- ▣ Inda é ta da um bata e un xinelo pa bu biste.

Dipos ki exame termina

- ▣ Bu debi labanta divagar;
- ▣ Durante 2/3 dia bu pôde perdi algum sangue ou tem corrimen-to escuro;
- ▣ Consoante resultado de exami e depende de critério à buta re-cebi novo marcason de consulta.

Informason importante

- ▣ Pa bu podi fazi kel exame li:
- ▣ Bu tem ki sabi data de inicio de bu ultimu menstruasan, mas bu ka debi sta menstruada na dia de exame;
- ▣ 48h ou 2 dia antes dêx exame, bu ka pôdi/devi fazi sexo nem poe pomada ou óvulos vaginal;
- ▣ Toma pequeno-almoço/mata bicho antes de exame.

SI POR ALGUM MOTIVO BU ODJA MA BU KATA CONSIGUI COM-PARECI NA DIA DE EXAME OU SI BU TIVER ALGUN DUVIDA NU TA AGRADECE PA BU AVIZA KU ANTECIDÊNCIA.

Contatos

Geral: 214348200

Extensões 2535/2548

Email: pa2@hff.min-saude.pt
pa4@hff.min-saude.pt