

PERFUSÃO ENDOVENOSA DE LIDOCAÍNA E KETAMINA

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR AO CONSENTIMENTO INFORMADO

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO A REALIZAR, NATUREZA E OBJETIVO DO MESMO:

A perfusão endovenosa de lidocaína e ketamina está indicada no controlo de dor crónica neuropática não oncológica (por exemplo: dor pós-cirúrgica, nevralgia pós-herpética, dor fantasma, entre outras), após resposta inadequada e/ou efeitos adversos intoleráveis aos tratamentos de primeira e segunda linha (fármacos anticonvulsivantes, antidepressivos e opióides). Consiste na administração de lidocaína e ketamina por via endovenosa, de forma contínua e lenta, durante aproximadamente 60 minutos. Este procedimento não requer internamento hospitalar.

BENEFÍCIOS PRETENDIDOS:

- Diminuição progressiva da intensidade da dor;
- Diminuição progressiva de sintomas associados à dor como alterações de sensibilidade (por exemplo: sensação de “picadas”, “formigueiro”);
- Redução de medicação analgésica oral.

RISCOS ASSOCIADOS:

A perfusão endovenosa de lidocaína e ketamina, como qualquer procedimento médico, apresenta riscos, embora sejam geralmente baixos. Estes incluem:

- Dor no local da punção venosa;
- Náuseas, vômitos e/ou cefaleias;
- Alucinações;
- Reações adversas aos fármacos utilizados.

ALTERNATIVAS:

As alternativas à perfusão endovenosa de lidocaína e ketamina incluem:

- Continuação da terapia médica com fármacos anticonvulsivantes, antidepressivos, opióides e fármacos adjuvantes de uso tópico.

RISCOS DE NÃO TRATAMENTO:

- Manutenção de dor neuropática intensa

NO DIA DO TRATAMENTO:

- Deve vir em jejum;
- Deve tomar a sua medicação habitual (salvo se indicado o contrário pela equipa da Unidade de Dor).

EXPLICAÇÃO DO TRATAMENTO:

- À chegada à Unidade de Dor será monitorizado e puncionado um acesso venoso periférico;
- Posteriormente, administrar-se-ão os fármacos pelo acesso venoso, de forma contínua durante 60 minutos;
- Após realização da técnica ficará monitorizado para vigilância cerca de 30 minutos;
- Deve sair do Hospital acompanhado.

