

# CONSULTA EXTERNA

## EXAMES ESPECIAIS DE UROLOGIA

### INSTILAÇÃO VESICAL

#### Em que consiste o tratamento?

Este tratamento consiste na introdução de um medicamento na bexiga, através de catéter fino, sob efeito de gel anestésico. No fim da instilação do líquido retira-se o catéter.

#### Qual a preparação para o tratamento?

- Tomar o pequeno-almoço/refeição ligeira;
- Esvaziar a bexiga imediatamente antes do tratamento.


#### Quais os cuidados a ter após o exame?

Em caso de tratamento com BCG ou MITOMICINA C:

- Terá de ficar deitado durante 1 hora e posicionar-se a cada 15 minutos, de bruços, lateral direito, costas e lateral esquerdo e sem urinar;
- Vigiar sinais de febre (a partir de 38°C), mau estar, existência de sangue na urina ou ardor ao urinar, durante 3 a 4 dias;
- Contacte um/a médico ou enfermeiro/a se estes sintomas forem muito acentuados ou dirija-se ao Serviço de Urgência.

Em caso de tratamento com ÁCIDO HIALURÓNICO DE SÓDIO:

- Não urinar durante pelo menos 30 minutos, retendo o produto o máximo de tempo possível;
- Vigiar sinais de febre ( a partir de 38°C).



#### Contactos:

214348280

[www.hff.min-saude.pt](http://www.hff.min-saude.pt)

#### Exames Especiais:

Dias Úteis das 9h 16h