

Profilaxia pós-exposição (PPE)

Guia de Utilização



UNIDADE LOCAL DE SAÚDE
AMADORA / SINTRA

A profilaxia pós-exposição (PPE) consiste na toma de medicamentos antirretrovirais de emergência e pode prevenir a infeção pelo VIH após uma potencial exposição ao vírus. O sucesso da PPE depende da **toma correta dos medicamentos antirretrovirais durante 28 dias** conforme a prescrição.

No Serviço de Urgência foi-lhe **entregue medicação para os primeiros 8 dias**.

À saída do Serviço de Urgência Geral, marque consulta de PPE-INFECIOLOGIA (1ª vez) que se realizará no Hospital de Dia de Infecção.

Na consulta de PPE-INFECIOLOGIA, a sua situação será reavaliada e será prescrita a restante medicação de forma a completar 28 dias de PPE.

COMO TOMAR OS MEDICAMENTOS?

1 comprimido de Dolutegravir de 50mg



1 comprimido de Emtricitabina 200mg/Tenofovir 245mg

Os comprimidos devem ser tomados imediatamente, e depois tomar de 24/24 horas.

Tome após uma refeição com água.

Os comprimidos não devem ser mastigados, esmagados ou partidos.

Os **efeitos secundários** são pouco frequentes, podendo surgir: diarreia, náuseas, vômitos, cansaço, tonturas ou dor de cabeça.

Interações medicamentosas: Garanta que o/a seu/sua médico/a ou farmacêutico/a têm conhecimento de todos os medicamentos que toma atualmente, bem como das suas doenças crónicas.

EM CASO DE DÚVIDA CONTACTE:

HOSPITAL DE DIA DE INFECIOLOGIA
(Contacto: 214345553, Horário: 2ª a 6ª
feira, das 08h30 às 16h00)

FARMÁCIA HOSPITALAR
(Contacto: 214345604, farmacia.ambulatorio@ulsasi.min-saude.pt,
Horário: 2ª a 6ª feira, das 08h00 às 17h00)

Estamos disponíveis para o (a) esclarecer.

