

PROVA DE CLONIDINA – O QUE É?

É a prova que permite avaliar a produção da hormona de crescimento

- ✓ Consiste na administração da Clonidina (medicamento) por via oral e na colocação de um cateter na veia;
- ✓ Irá sentir uma pequena picada, um ligeiro desconforto;
- ✓ Através deste cateter são feitas as várias colheitas de sangue necessárias à realização da prova, evitando assim novas picadas;
- ✓ Ocasionalmente, os efeitos secundários poderão ser a hipotensão arterial (tensão baixa), Cefaleias (dor de cabeça) e alguma sonolência;
- ✓ A prova tem uma duração de aproximadamente 2 a 3 horas;
- ✓ A prova decorre num ambiente controlado e com vigilância. Qualquer reacção adversa será de imediato avaliada pelo(a) médico (a) e revertida com administração de terapêutica se necessário;
- ✓ Os resultados da prova demoram entre 1 a 3 semanas.

NO DIA DA PROVA

- ✓ **Jejum (sólidos e líquidos) de 8h;**
- ✓ Devem **trazer** um pequeno lanche para ingerir após a prova;
- ✓ Os/as acompanhantes devem permanecer sempre junto da criança/jovem e trazer alguns brinquedos, livros ou outro material de distração;
- ✓ Durante a prova a criança /jovem pode beber água;
- ✓ Após a prova a criança/jovem deverá ficar em repouso.

Horário HDP: Segunda a Sexta-Feira (8h às 15.30h)

Respeite a hora marcada do procedimento.

Avise o HDP sempre que não lhe for possível comparecer.

Contactos: 214345631 / hospitaldiapediatria@hff.min-saude.pt

Em caso de dúvida, questione os profissionais de saúde.

