

O SERVIÇO

O Serviço de Patologia Clínica (SPC) da Unidade Local de Saúde Amadora/Sintra realiza exames laboratoriais no domínio da Patologia Humana e consultas de hipocoagulação.

Horário de funcionamento para visitantes:

Laboratório de Rotina: 8h00 - 18h00 (dias úteis)

Laboratório de Urgência (para assistência técnica): 24h/dia (todos os dias)

ATENDIMENTO DOS VISITANTES

Os visitantes são recebidos na secretaria do SPC por uma Assistente Administrativa, que fornece todas as informações necessárias e orienta o visitante para o colaborador ou laboratório que pretende visitar, de acordo com a disponibilidade ou marcação prévia.

Os representantes das casas comerciais dos equipamentos instalados no SPC, nomeadamente os Engenheiros que executam as manutenções preventivas/corretivas, são orientados para os laboratórios e respetivos equipamentos, sendo informado da sua presença um colaborador do laboratório em causa (Médico Patologista Clínico, Técnico Superior de Saúde ou Técnico de Análises Clínicas e Saúde Pública).

MEDIDAS DE PROTEÇÃO

O uso de Equipamentos de proteção Individual (EPI) poderá ser necessário para os visitantes que permaneçam nas áreas laboratoriais. Informe-se das medidas de proteção necessárias para a garantia da sua segurança no laboratório.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO

Nas áreas laboratoriais devem ser cumpridos os seguintes requisitos:

Gerais:

Rigorosa higiene pessoal;
Proibido comer, beber ou fumar;

Situações em que está previsto intervenção em equipamentos ou contacto com amostras:

Proteger feridas ou outras lesões cutâneas
Evitar tocar com as mãos nos olhos, nariz ou boca, enquanto se trabalha e antes de lavar as mãos;
Procedimentos técnicos executados de modo a evitar a formação de aerossóis ou gotículas;
Manipular os frascos e ampolas de vidro com cuidado para não derramar o seu conteúdo e/ou não provocar aerossóis;
Se as mucosas dos olhos, nariz ou boca forem atingidas por salpicos, lavar muito bem com água corrente;
Tratar imediatamente picadas ou cortes ocorridos durante o trabalho; lavar abundantemente com água corrente, sem esfregar ou pressionar a zona lesada (nunca colocar a boca na lesão);
Remover imediatamente as luvas no caso de perfuração ou rutura e lavar as mãos antes de calçar luvas novas.

Em caso de emergência, siga as orientações dadas pelos profissionais do SPC.

