

# CONSULTA EXTERNA

## TRATAMENTO DA HEPATITE C



UNIDADE LOCAL DE SAÚDE  
AMADORA / SINTRA

A infecção por hepatite C pode ser tratada com medicamentos antivirais destinados a eliminar o vírus do seu corpo. De acordo com o/a seu/a médico/a, o seu tratamento é o seguinte:

### POSOLOGIA

Medicamento	Manhã	Noite
<b>Maviret</b> ® (Glecaprevir+ Pibrentasvir)		
<b>Epclusa</b> ® (Velpatasvir+ Sofosbuvir)		
<b>Ribavirina</b> ®		

### DURAÇÃO PREVISTA DO TRATAMENTO

8 Semanas	
12 Semanas	
16 Semanas	

### EFEITOS SECUNDARIOS:

Em geral estes medicamentos são bem tolerados. Se existirem efeitos secundários são ligeiros como fadiga, dor de cabeça ou náuseas.

### CUIDADOS A TER:

Os comprimidos devem ser tomados inteiros, com alimentos e sempre à mesma hora;  
O chá de hipericão ou Erva de S. João diminuem a concentração destes medicamentos, por isso estão desaconselhados;  
Alguns medicamentos adquiridos com ou sem receita médica, também podem interferir com o tratamento.  
Informe sempre o/a seu/a médico/a sobre a medicação que está a tomar.  
Durante o tratamento não deve amamentar;  
Se estiver em idade fértil deverá fazer contraceção segura.

### O QUE FAZER EM CASO DE ESQUECIMENTO:

**Tome o comprimido logo que se lembre:** Se o esquecimento for descoberto no mesmo dia (geralmente num intervalo de 12 a 18 horas) tome a dose esquecida assim que possível.

**Se estiver quase na hora da próxima dose:** Não tome a dose esquecida. Aguarde e tome a próxima dose no horário habitual.

**Nunca duplique a dose:** em caso de esquecimento não tome dois comprimidos para compensar.

**Mais de 1-2 dias esquecidos:** entre em contacto com o seu médico imediatamente.

### O QUE FAZER SE VOMITAR:

**O tempo importa:** se o vômito ocorrer dentro de 3 horas após tomar o comprimido é provável que o medicamento não tenha sido absorvido. É recomendado que tome outro comprimido.

**Não repita a dose:** se vomitar pós 3 horas da toma do medicamento não necessita de uma dose adicional. Espere pela próxima dose programada.

**Se os episódios de vômito forem frequentes, informe o/a seu/a médico/a.**

### SE NECESSÁRIO, ENTRE EM CONTACTO COM O SERVIÇO

Posto de Apoio (7): 21 434 82 01  
Gabinete de Enfermagem: 21 434 82 49

Enfermeiro/a \_\_\_\_\_  
Médico/a assistente \_\_\_\_\_

