

Desobstrução da via aérea

A maioria de situações de obstrução da via aérea nas crianças, ocorre durante a alimentação ou quando as crianças estão a brincar com objetos de pequenas dimensões.

Na maioria das vezes, são situações presenciadas pelo que o socorro pode ser iniciado de imediato, ainda com a criança consciente.

Obstrução da via aérea pode ser:

Parcial
Total

Pode ser classificado como:

Ligeira
Grave

Internamento Pediatria



Desobstrução da via aérea

INFORMAÇÃO PARA O/A UTENTE E FAMÍLIA

Contato de
Emergência: 112



GRUPO DE REANIMAÇÃO DO
SERVIÇO DE INTERNAMENTO
DE PEDIATRIA



Obstrução da via aérea

Adulto

Bebé

O que vê

Tosse

Dificuldade em respirar

Coloração arroxeada ao redor dos lábios



1



2

O que faz

Segurar o bebé em decúbito ventral; **1**

Aplicar 5 pancadas firmes entre as 2 omoplatas;

Faça 5 compressões torácicas; **2**

Inspeccionar a cavidade oral, removendo algum objeto, se visível.

O que vê

Tosse sem som

Dificuldade em respirar

Faz sinal de asfixia

Dificuldade em falar ou produzir sons

Consegue tossir e produzir sons

O que faz

Executar compressões abdominais até:

1. Que o objeto seja expulso;
2. ficar inconsciente.

LIGAR 112

Incentivar a tosse



Criança

O que vê

Tosse

Dificuldade em respirar

Ruido Respiratório

Coloração arroxeada ao redor dos lábios



3



4

O que faz

Segurar a criança e virá-la de costas para si, em decúbito ventral, **3**

Aplicar 5 pancadas firmes entre as 2 omoplatas;

Faça 5 compressões abdominais; **4**

Inspeccionar a cavidade oral, removendo algum objecto, se visível.

Se o/a bebé ou a criança ficar inconsciente, ligar 112.

Se a obstrução for resolvida com a remoção do corpo estranho, deve ser feita uma avaliação do estado da criança.

Deve levar o/a bebé ao serviço de Urgência.